

Presidio Ospedaliero - Santa Maria Goretti- Servizio di Farmacia - Tel.: 0773/6553075-3076-3077 Fax.: 0773/6553074

P.O.Nord P.O.Centro P.O.Sud

RICHIESTA DI GABESATO MESILATO


Data ___/___/___/

Reparto – U.O.: _____ Centro di Costo ___/___/___/___/___/___/

Paziente (iniziali) o cartella clinica : _____ Età _____

Dose/die: _____ Durata prevista del trattamento: _____

MOTIVAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO: (barrare l'indicazione)


 Indicazioni terapeutiche approvate:

Pancreatite acuta necrotizzante^{nota 1} ecografia e/o TAC addominale SI NO

 Indicazioni terapeutiche appropriate:

Profilassi di pancreatite acuta post-colangio-pancreatografia endoscopica retrograda (ERCP) nelle seguenti categorie a maggior rischio di sviluppare PA^{nota 2}:

- disfunzioni dello sfintere di Oddi sospette o già diagnosticate
- età giovanile
- pregressa pancreatite acuta post-ERCP
- manometria dello sfintere di Oddi e durante l'esecuzione dell'ERCP, se si rilevano i seguenti eventi:
- acinarizzazione pancreatica (eccessiva introduzione di mezzo di contrasto nel dotto pancreatico)
- difficoltà all'incannulazione della papilla di Vater (ripetuti tentativi di incannulazione)
- ripetute iniezioni di mezzo di contrasto
- sfinterotomia con pre-cut
- diametro esile del coledoco (in pazienti con sospetta disfunzione dello sfintere di Oddi)

 Indicazioni terapeutiche non approvate:

- Pancreatite acuta edematosa**
- Altre (sono richiesti l'assunzione di responsabilità da parte del medico ed il consenso informato da parte del paziente) _____
(specificare)

Il Medico richiedente _____
(in stampatello)
n. telefono interno _____ Timbro e Firma _____

Parte riservata alla Farmacia: Quantità consegnata _____
Il Farmacista _____ Data ___/___/___/

NOTE:

- 1) Pancreatite acuta necrotizzante documentata da referto ecografico e/o TAC:
 - il trattamento deve essere iniziato il più precocemente possibile, ed almeno 24-48 ore dall'esordio clinico;
 - il dosaggio è compreso tra 900 mg e 3g/die in infusione continua (nella maggior parte dei casi il dosaggio utilizzato è di 1,5 g/die)
 - in media la terapia dovrebbe durare 5-7 giorni; se dopo 7 giorni non vi sono evidenze di efficacia, il trattamento va sospeso;
 - il costo della terapia con 1,5g di gabesato è di euro 142,23/die (prezzo medio ponderato)
- 2) Profilassi della pancreatite acuta post-ERCP:
 - 1g in 12 ore in somministrazione continua da iniziare da 30 a 90 minuti prima dell'inizio della procedura endoscopica e da continuare fino al completamento della dodicesima ora;
 - al termine dell'infusione, la terapia potrà essere continuata solo se presente una forma necrotizzante di malattia documentata da TAC;
 - il costo ospedaliero della profilassi con gabesato mesilato è di euro 94,82/die (prezzo medio ponderato).