

ASL LATINA - UOC Farmaceutica Territoriale e Integrativa

Dott.ssa Loredana Arenare - Dott. Gianluca di Manno – Dott.ssa Angela Vellucci – Dott.ssa Pina Gomma -
Dott.ssa Paola Addio – Dott. Sebastian Stamegna – Dott.ssa Francesca Colaccio – Dott.ssa Francesca Raia

Numero 10

Data 29/05/2026

EPARINE A BASSO PESO MOLECOLARE (EBPM) E FONDAPARINUX

Le Eparine a Basso Peso Molecolare (EBPM) e il Fondaparinux (FPX) rappresentano una categoria terapeutica ampiamente utilizzata nella pratica clinica e di grande impatto sulla spesa farmaceutica. Sono farmaci che sono frequentemente oggetto di inappropriatezza prescrittiva a causa di una complessa normativa in continuo aggiornamento che ne regola la prescrizione e la successiva erogazione.

Nella Regione Lazio l'erogazione dei medicinali appartenenti alla classe delle EBPM è stata rimodulata attraverso **due canali distributivi** differenziati in base all'indicazione clinica e alla durata della terapia.

DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC) – riservato usi protratti

1. Per le **indicazioni off label** previste dalla **Legge 648/96**;
2. Per le **indicazioni del Prontuario PHT** (es. chirurgia generale maggiore e ortopedica maggiore)

CONVENZIONATA

1. Per tutte le altre **indicazioni autorizzate in RCP**

Tutte le prescrizioni per **usi protratti** e per gli **usi off label** previsti dalla **L. 648/96**, necessiteranno dell'**inserimento nel sistema Webcare di un PT on line da parte degli specialisti**. **Solo successivamente i medici di medicina generale potranno ripetere la prescrizione in DPC.**

Gli specialisti coinvolti sono quelli operanti nei seguenti ambiti:

● Oncologico ● Ginecologico ● Chirurgico ● Vascolare (centri TAO)

TABELLA PRESCRIZIONE ED EROGAZIONE EBPM

	Indicazioni	Durata max (giorni)	Canale erogazione	PT Online (WEBCARE)	Prescrittore
Indicazioni autorizzate in RCP	Profilassi TVP in chirurgia ortopedica maggiore	35 (5 settimane)	DPC	SI	Specialista Ortopedia
	Profilassi TVP in chirurgia generale maggiore	28 (4 settimane)	DPC	SI	Specialista Chirurgia
	Profilassi TVP in chirurgia generale e ortopedica minore	10	Convenzionata	NO	MMG
	Profilassi TVP in pazienti non chirurgici allettati e a rischio di TVP	14	Convenzionata	NO	MMG
	Trattamento TVP	10	Convenzionata	NO	MMG
	Trattamento prolungato della TVP/Embolia polmonare e prevenzione delle recidive in pazienti oncologici	183 (6 mesi)	DPC	SI	Specialista Oncologia
	Trattamento di adulto con TVS acuta degli arti inferiori in assenza di TVP concomitante (solo Fondaparinux)	45	DPC	NO	MMG
Indicazioni previste nella Legge 648/96	Profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio	287 (41 settimane)	DPC	SI	Specialista Ginecologia
	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti vitamina K (AVK) per manovre chirurgiche e/o invasive (bridging-therapy)	7	DPC	SI	Specialista Vascolare
	Profilassi della TVP in pazienti oncologici ambulatoriali a rischio (KHORANA >3)	365 (1 anno)	DPC	SI	Specialista Oncologia
	Altre indicazioni in uso consolidato in pediatria	365 (1 anno)	DD	NO	Specialista
Altri usi Off Label	Pazienti allettati dopo evento acuto in carico al CAD	30	ADI CAD	NO	Richiesta CAD dal MMG