

**Cardiologia Interventistica**

<b>CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA*</b>	<b>ALTERNATIVA**</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<b>- IMPIANTO DI PMK o ICD</b> <b>- Impianto di Amplatz per chiusura PFO o DIA</b> <b>- Impianto di Amplatz AMULET per chiusura Auricola sinistra</b>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g</b> ev sinogla dose da ripetere dopo 4h, se il p.c. è > 120 kg <b>3g</b> <u>Oppure</u> <b>VANCOMICINA 15 mg/kg</b> singola dose	<b>CLARITROMICINA FL 500 mg</b> unica dose <u>Oppure</u> <b>CLINDAMICINA 900 mg</b> ev singola dose	<b>REDOSING</b> <b>CEFAZOLINA 2 gr</b> dopo 4 h
<b>STUDIO ELETTROFISIOLOGICO ENDOCAVITARIO</b>  <b>oppure</b> <b>IMPIANTO DI PACEMAKER TRANSVENOSO TEMPORANEO</b>  <b>oppure</b> <b>REIMPIANTO</b>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g</b> ev sinogla dose da ripetere dopo 4h, se il p.c. è > 120 kg <b>3g</b> <u>Oppure</u> <b>VANCOMICINA 15 mg/kg</b> singola dose	<b>CLARITROMICINA FL 500 mg</b> unica dose <u>Oppure</u> <b>CLINDAMICINA 900 mg</b> ev singola dose	<b>REDOSING</b> <b>CEFAZOLINA 2 gr</b> dopo 4 h

\* ricostruzione aortica addominale, procedure degli arti inferiori che comportano incisione inguinale, qualunque procedura vascolare che comporti inserimento di protesi o di corpi estranei, amputazione arti inferiori per ischemia, pacemaker permanenti

\*\* Antibiotico in alternativa nei pazienti allergici ai Betalattami

## Chirurgia generale

<b>CHIRURGIA GENERALE DI PARETE</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA</b>	<b>ALTERNATIVA</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<b>ERNIOPLASTICA INGUINALE CRURALE O ERNIE RARE (con o senza utilizzo di protesi)</b>  <b>ERNIOPLASTICALAPAROSCOPICA</b>  <b>NODULECTOMIA</b>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g ev</b> singola dose daripetere dopo 4h, se il p.c. è > 120 kg <b>3g</b>	<b>VANCOMICINA 1 gr/Kg</b> singola dose <b>1,5 gr</b> se p.c. > 90 kg  <b>Clindamicina 900 mg</b> singola dose <b>Ampicillina/Sulbactam 3 gr</b> singola dose  Nota: I benefici della profilassi non sono certi nei pz sani sottoposti a procedure "pulite" senza utilizzo di corpi estranei (protesi) Nota: Gli antibiotici risultano essere particolarmente utili nella chirurgia senologica oncologica o in caso di impianti protesici Nota: particolarmente indicata in caso di utilizzo di reti protesiche in caso di interventi o plastica erniale.	

<b>CHIRURGIA GENERALE DI PARETE</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA</b>	<b>ALTERNATIVA</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<b>LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA E LISI DI ADERENZE</b>	<b>NO*</b>			
<b>BIOPSIA LINFONODALE SUPERFICIALE</b>	<b>NO*</b>			
<b>ASPORTAZIONE CISTI LIPOMI</b>	<b>NO*</b>			
<b>CHIRURGIA GASTRODUODENALE O BILIARE</b>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 gr ev</b> singola dose ripetere dopo 4 h se P.C. > 120 kg <b>3 gr</b>	<b>VANCOMICINA 15 mg/Kg</b> singola dose  <b>CLINDAMICINA 900 mg</b> singola dose  <b>GENTAMICINA 5 mg/kg</b> singola dose	
<b>ERCP</b>	<b>NO</b> in assenza di ostruzioni  <b>SI</b> se ostruzione	<b>CIFROPLOXACINA 500 mg os</b> <b>400 mg ev</b> 2 h prima della procedura Oppure <b>PIPERACILLINA/TAZO BACTAM 4,5 gr ev</b> 1 h prima della procedura		

<b>CHIRURGIA GENERALE COLON RETTO</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA</b>	<b>ALTERNATIVA</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<b>CHIRURGIA COLON RETTO COMPRESA:</b>  <b>APPENDICECTOMIA</b>  <b>RICANALIZZAZIONE INTESTINALE</b>	<b>SI</b>	<b>In caso di procedure elettive:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preparazione meccanica intestinale</li> <li>- antibiotici orali: neomicina, eritromicina nel giorno preoperatorio</li> <li>- antibiotici ev</li> </ul> <b>OS:</b> 4 l di I Polietelene glycol, dieta liquida chiara, alle ore 13 e alle ore 14 e alle ore 23 neomicina 1gr ed eritromicina 1gr per os. Nulla per bocca dopo mezzanotte compreso i liquidi.	Se allergia ai BETALATTAMICI  <b>CLINDAMICINA 900 mg ev + CIFLOXAPICINA 400 mg ev</b>	
		<b>In caso di procedure in urgenza:</b> <b>CEFAZOLINA 2 gr</b> <b>METRODINAZOLO 500 mg</b> unica somministrazione da ripetere dopo 4 h. <b>AMPICILINA/SULBACTAM 3GR ev</b> <b>CEFTRIAXONE 2 gr + METRODINAZOLO 500 mg ev</b> quest'ultimo regime è particolarmente nei centri con alti tassi di resistenza alle cefalosprine di prima e seconda generazione		

## Chirurgia vascolare

<b>CHIRURGIA VASCOLARE</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA</b>	<b>ALTERNATIVA</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CHIRURGIA SU PROTESI VASCOLARE</b></li> </ul>	SI	CEFAZOLINA 2 g		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CHIRURGIA ELETTIVA DELL'AORTA ADDOMINALE E TORACICA OPEN/ENDOVASCOLARE</b></li> </ul>	SI	CEFAZOLINA 2 g		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CHIRURGIA DEGLI ARTI INFERIORI CHE COMPORTA INCISIONE ELETTIVA INGUINALE INCLUSA L'EMBOLECTOMIA</b></li> </ul>	SI	CEFAZOLINA 2 g		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AMPUTAZIONE DELL'ARTO INFERIORE PER ISCHEMIA</b></li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IMPIANTO DI MATERIALE PROTESICO VASCOLARE IN QUALUNQUE SEDE</b></li> </ul>	SI	CEFAZOLINA 2 g		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ENDOARTERIECTOMIA CAROTIDEA</b></li> </ul>	SI	CEFAZOLINA 2 g		

<b>CHIRURGIA VASCOLARE</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA</b>	<b>ALTERNATIVA</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<b>INTERVENTI SULLE VENE</b>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g</b>	<b>CLINDAMICINA 600/900 Mg + GENTAMICINA 3 mg/Kg</b>	
<b>FISTOLE A/V PER EMODIALISI</b>	<b>concordata con il nefrologo</b>			

## Chirurgia ginecologica

<b>CHIRURGIA OSTETRICA/GINECOLOGICA</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA</b>	<b>ALTERNATIVA</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<b>TAGLIO CESAREO ELETTIVO</b>	<b>SI</b>	<b>AL CLAMPAGGIO DEL CORDONE: CEFAZOLINA 2 g</b>	<b>CLARITROMICINA 500 mg CLINDAMICINA 600 mg GENTAMICINA EV 3 mg/kg</b>	
<b>ABORTI OSTETRICI 1° TRIMESTRE ED IVG</b>	<b>NO*</b>			
<b>ABORTO DEL 2° TRIMESTRE</b>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g</b> Se non ci sono indicazioni preoperatorie specifiche (liquido tinto, febbre, PROM > 12 ore) all'estrazione fetale	<b>CLARITROMICINA 500 mg CLINDAMICINA 600 mg GENTAMICINA 3 mg/kg</b>	

<b>CHIRURGIA OSTETRICA/GINECOLOGICA</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA</b>	<b>ALTERNATIVA</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<b>TC NON ELETTIVO CON TRAVAGLIO IN ATTO E/O PROM &gt; 6 ORE PRIMA DELL'INTERVENTO</b>	<b>SI</b>	<b>1° SCELTA: CEFAZOLINA 2 g</b>  <b>2° SCELTA: PIPERACILLINA 4 g</b>	<b>CLARITROMICINA 500 mg CLINDAMICINA 600 mg GENTAMICINA 3 mg/Kg</b>	
<b>INTERVENTI DI CHIRURGIA GINECOLOGIA MINORE:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LAPAROSCOPIE DIAGNOSTICHE ed OPERATIVE</b></li> <li>• <b>CONIZZAZIONI</b></li> <li>• <b>ISTEROSCOPIE (diagnostiche e terapeutiche)</b></li> <li>• <b>ASPORTAZIONE DI CISTI VAGINALI NON SUPPURATE</b></li> </ul>	<b>NO*</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g</b>	<b>CLARITROMICINA 500 mg CLINDAMICINA 600 mg GENTAMICINA 3 mg/Kg</b>	

\* In assenza di raccomandazioni, la somministrazione della profilassi antibiotica può essere indicata per pazienti che presentano fattori di rischio per infezione quali ad esempio diabete, obesità, immunodepressione, senilità, stato di malnutrizione, punteggio ASA elevato.



## CHIRURGIA OSTETRICA/GINECOLOGICA

INTERVENTO	RACCOM	PRIMA SCELTA	ALTERNATIVA	INTERVENTO PROLUNGATO
<b>INTERVENTI DI CHIRURGIA GINECOLOGICA MAGGIORE NON ONCOLOGICA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIOMECTOMIE</li> <li>• ISTERECTOMIE (Laparoscopiche Vaginali e Laparotomiche)</li> <li>• INTERVENTI UROGINECOLOGICI</li> <li>• VULVECTOMIE SEMPLICI</li> </ul>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g</b>	<b>CLARITROMICINA 500 mg</b> <b>CLINDAMICINA 600 mg</b> <b>GENTAMICINA 3 mg/kg</b> <b>NETILMICINA SOLFATO 150 mg</b>	<b>REDOSING SUPERATOIL T<sup>1/2</sup></b>
<b>INTERVENTI ONCOLOGICI</b>	<b>SI</b>	<b>UNASYN 3g</b>		
<b>INTERVENTI SULLA GHIANDOLA DEL BARTOLINO</b>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g</b>	<b>CLARITROMICINA 500 mg</b> <b>CLINDAMICINA 600 mg</b> <b>GENTAMICINA EV 3 mg/kg</b>	
<b>CERCHIAGGIO CERVICALE</b>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g</b>	<b>CLARITROMICINA 500 mg</b> <b>CLINDAMICINA 600 mg</b> <b>GENTAMICINA EV 3 mg/kg</b>	

## Neurochirurgia

<b>NEUROCHIRURGIA</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA</b>	<b>ALTERNATIVA</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CRANIOTOMIA</b> (Chirurgia Neuro-oncologica, Neurovascolare, Neurotrauma – <i>senza</i> lesioni penetranti)</li> <li>• <b>SPINALE</b> (Intradurale, Extradurale, Strumentato)</li> </ul>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 gr ev</b>  I benefici della profilassi prolungata in caso di deviazioni ventricolari esterna non sono chiari e quindi le pratiche cliniche sono variabili	<b>VANCOMICINA 1 g ev</b>  <b>CLINDAMICINA 900 mg ev</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NEUROTRAUMA</b> (Chirurgia del trauma cranico con ferite penetranti e/o contenuto intracranico esposto e rischio di contaminazione liquorale)</li> </ul>	<b>SI</b>	<b>CEFTRIAXONE 2 gr ev</b> + <b>METRONIDAZOLO 500 MG</b>	<b>AMPICILLINA/SULBACTAM 3 gr</b> oppure <b>PIPERACILLINA/TAZOBACTAM 4,5 gr ev</b> oppure <b>AMOXICILLINA/CLAVULANATO 2,2 gr ev</b>	

## Chirurgia oculistica

<b>CHIRURGIA OCULISTICA</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA</b>	<b>ALTERNATIVA</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CATARATTA</li> <li>• GLAUCOMA</li> <li>• INTRAVITREALI AntiVEGF</li> <li>• PTERIGIO</li> <li>• ANNESSI OCULARI</li> </ul>	<b>NO</b>	È prevista profilassi preoperatoria antisettica		

## Chirurgia ortopedica

<b>CHIRURGIA ORTOPEDICA</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA</b>	<b>ALTERNATIVA*</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<b>CHIRURGIA DELL'ANCA. CHIRURGIA DI COLONNA E PROTESI ARTICOLARI</b>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g</b> prima dose <b>3 g</b> se p.c. > 120 Kg  aggiungere <b>VANCOMICINA 1 g</b> singola dose se PZ è colonizzato da MRSA  <b>CEFTRIAXONE 2 g ev</b> (RIDUZIONE DI FRATTURE CON FISSATORI)	<b>VANCOMICINA 1 g</b> singola dose  <u>Oppure</u> <b>CLINDAMICINA 900 g</b> singola dose	

\* Antibiotico in alternativa nei pazienti allergici ai Betalattami

## Chirurgia O.R.L.

<b>CHIRURGIA O.R.L.</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA</b>	<b>ALTERNATIVA</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<b>ADENOIDECTOMIA</b>	<b>NO*</b>			
<b>TONSILLECTOMIA</b>	<b>NO*</b>			
<b>SETTOPLASTICA</b>	<b>NO*</b>			
<b>POLIPOSI NASALE</b>	<b>NO*</b>			
<b>OTOCHIRURGIA</b>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g</b>	<b>CLINDAMICINA 600 mg</b>  <b>oppure</b> <b>COTRIMOXAZOLO 80 mg +</b> <b>TRIMETOPRIM 400 mg 2 FLAC</b>	<b>REDOSING SUPERATOIL</b> <b>T<sup>1/2</sup></b>
<b>INTERVENTI SULLE GHIANDOLE SALIVARI</b>	<b>NO*</b>			

## Chirurgia urologica

<b>CHIRURGIA UROLOGICA/ANDROLOGICA</b>				
<b>INTERVENTO</b>	<b>RACCOM</b>	<b>PRIMA SCELTA</b>	<b>ALTERNATIVA</b>	<b>INTERVENTO PROLUNGATO</b>
<b>INTERVENTI SUL TESTICOLO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● IDROCELE</li> <li>● VARICOCELE</li> <li>● ORCHIDOPESSI</li> <li>● ORCHIECTOMIA</li> </ul> <b>ALTRI INTERVENTI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● CISTI DELL'EPIDIDIMO</li> <li>● FIMOSI</li> </ul>	<b>NO*</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g</b>	<b>CLINDAMICINA 600 mg</b>	<b>REDOSING SUPERATO IL T<sup>1</sup>/<sub>2</sub></b>
<b>INTERVENTI SUL RENE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● NEFROTOMIA</li> <li>● NEFROSTOMIA</li> <li>● NEFRECTOMIA</li> </ul> <b>INTERVENTI PER CALCOLOSI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● LITOTRISSIA CON ONDE D'URTO</li> </ul>	<b>SI</b>	<b>CEFAZOLINA 2 g</b>	<b>CLINDAMICINA 600 mg</b>	<b>REDOSING SUPERATO IL T<sup>1</sup>/<sub>2</sub></b>