

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CLASSIFICAZIONE	IMPIEGO	MODALITA' USO	MODALITA' DI CONSERVAZIONE
ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI	ANTISETTICO +DETERGENTE MECCANICO	CUTE LESA	UTILIZZO IN SOLUZIONE DILUITE APPLICAZIONE ESTERNA	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
AMUKINE MED 0,05% 500 ML	ANTISETTICO AD AZIONE RAPIDA	CUTE INTEGRA	DISINFEZIONE PUNTO DI INSERZIONE DI CATETERI DISINFEZIONE AREA CUTANEA DELLE TERAPIE INIETTIVE LAVAGGIO DELLA CUTE INTEGRA	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
CHLORAPREP 4%	ANTISETTICO AD AZIONE RAPIDA	CUTE INTEGRA	DISINFEZIONE PREVENTIVA DELLA CUTE PER INTERVENTI CHIRURGICI E PROCEDURE MEDICHE INVASIVE	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
CLOREXINAL 2%	DISINFETTANTE ED ANTISETTICO	SUPERFICI E PIANI LAVORO E CUTE INTEGRA	DISINFEZIONE PREVENTIVA DELLE SUPERFICI E DEI PIANI DI LAVORO E APPLICAZIONE ANTISETTICA DELLA CUTE NELLE AREE INIETTIVE	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
CLOREXISAN 2%	ANTISETTICO	MUCOSA INTEGRA DEL CAVO ORALE	DISINFEZIONE DEL CAVO ORALE	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
FENOCID	DISINFETTANTE E DECONTAMINANTE	DISPOSITIVI MEDICI E FERRI CHIRURGICI A CONTATTO CON LE MUCOSE	DILUIZIONE IL PRODOTTO IN ACQUA FINO AD UNA CONCENTRAZIONE DI 0,4% v/v CON TEMPO DI CONTATTO CON IL DISPOSITIVO PARI A 30 MINUTI	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
GIOALCOL 70 1L	DISINFETTANTE	SUPERFICI E PIANI DI LAVORO	APPLICAZIONE SENZA DILUIZIONE DEL PRODOTTO CON TEMPO DI CONTATTO CON LE SUPERFICI PARI A 30 MINUTI	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
GIOCLOR	DISINFETTANTE	SUPERFICI E PIANI LAVORO	DILUIRE IL PRODOTTO IN ACQUA FINO AD UNA CONCENTRAZIONE DI 5% v/v CON TEMPO DI CONTATTO PARI A 20 MINUTI	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
GIOPERACETIC 5 L	DISINFETTANTE	DISPOSITI MEDICI	APPLICAZIONE SENZA DILUIZIONE DEL PRODOTTO CON TEMPO DI CONTATTO CON LE SUPERFICI PARI A 30 MINUTI	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
GIOSEPT ON 1 L	DISINFETTANTE E DECONTAMINANTE	DISPOSITI MEDICI	APPLICAZIONE SENZA DILUIZIONE DEL PRODOTTO CON TEMPO DI CONTATTO CON I DISPOSITIVI MEDICI PARI A 15 MINUTI	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
LH NEW CLOREXIDINA 70	ANTISETTICO	CUTE INTEGRA	DISINFEZIONE DELLE MANI PRIMA DI PROCEDURE OPERATORIE E DELLA CUTE INTEGRA NELLA ZONA PREOPERATORIA	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CLASSIFICAZIONE	IMPIEGO	MODALITA' USO	MODALITA' DI CONSERVAZIONE
LIFOSCRUB	ANTISETTICO	CUTE INTEGRA	LAVAGGIO ANTISETTICO DELLE MANI CON UN VOLUME DI PRODOTTO PARI A 5 ML E TEMPO DI CONTATTO PARI AD 1 MINUTO	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
MELSEPT SPRAY	DISINFETTANTE	SUPERFICI E PIANI DI LAVORO	NEBULIZZARE SULLE SUPERFICI AD UNA DISTANZA DI 25 CM E CON TEMPO DI CONTATTO DI 5 MINUTI	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
NEOGIOZYM	DISINFETTANTE	DISPOSITIVI MEDICI	LAVAGGIO DELLE APPARECCHIATURE IN AMBITO UROLOGICO, ENDOSCOPICO E DI STRUMENTARIO OPERATORIO	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
NEX IODIO P2	ANTISETTICO AD AZIONE RAPIDA	CUTE INTEGRA	DISINFEZIONE DELLE MANI PRIMA DI PROCEDURE OPERATORIE, USANDO IL LATO DELLA SPUGNA DISPENSER CON UN TEMPO DI CONTATTO DI 3 MINUTI	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
NEXCLOREX C2	ANTISETTICO AD AZIONE RAPIDA	CUTE INTEGRA	DISINFEZIONE DELLE MANI PRIMA DI PROCEDURE OPERATORIE, USANDO IL LATO DELLA SPUGNA DISPENSER CON UN TEMPO DI CONTATTO DI 3 MINUTI	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
POVIDERM*10%	ANTISETTICO	CUTE LESA ED INTEGRA	APPLICARE IL PRODOTTO NON DILUITO SULLA CUTE E TAMPONARE LA ZONA DI APPLICAZIONE.RIPETERE LA PROCEDURA MASSIMO 4 VOLTE AL GIORNO	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA
SIMPLY GEL	ANTISETTICO	CUTE LESA	DISINFEZIONE CHIRURGICA DELLE MANI CON TEMPO DI CONTATTO DI 30 SECONDI	CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA