

## ALLEGATO 1 - Prontuario dei disinfettanti e degli antisettici attualmente in uso presso la ASL Latina.

| PRODOTTO / CONTENUTO                                            | CLASSIFICAZIONE                       | IMPIEGO                                                        | INDICAZIONI / MODALITA' USO                                                                                                                                                                                          | MODALITA' DI CONSERVAZIONE                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI<br>(PEROSSIDO DI IDROGENO 3%)        | ANTISETTICO + DETERGENTE<br>MECCANICO | CUTE NON GRAVEMENTE LESA                                       | UTILIZZO IN SOLUZIONE DILUITA. APPLICAZIONE ESTERNA.                                                                                                                                                                 | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| AMUKINE MED 0,05%<br>(SODIO IPOCLORITO 0,05%)                   | ANTISETTICO AD AZIONE RAPIDA          | CUTE INTEGRA E NON GRAVEMENTE LESA                             | DISINFEZIONE E PULIZIA DELLA CUTE NON GRAVEMENTE LESA (FERITE SUPERFICIALI DI PICCOLE DIMENSIONI, PIAGHE DA DECUBITO CON INTERESSAMENTO LIMITATO ALL'EPIDERMIDE, USTIONI DI I GRADO); DISINFEZIONE GENITALI ESTERNI. | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| CHLORAPREP<br>(CLOREXIDINA 2% + ALCOOL<br>ISOPROPILICO 70%)     | ANTISETTICO AD AZIONE RAPIDA          | CUTE INTEGRA                                                   | DISINFEZIONE PREVENTIVA DELLA CUTE PER INTERVENTI CHIRURGICI E PROCEDURE MEDICHE INVASIVE.                                                                                                                           | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| CLOREXISAN COLLUTORIO<br>(CLOREXIDINA 0,2%)                     | ANTISETTICO                           | MUCOSA INTEGRA DEL CAVO ORALE                                  | DISINFEZIONE DEL CAVO ORALE.                                                                                                                                                                                         | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| CORE-SCRUB P<br>(IODOPOVIDONE 7,5%)                             | ANTISETTICO                           | CUTE INTEGRA                                                   | DISINFEZIONE DELLE MANI PRIMA DI PROCEDURE OPERATORIE, USANDO IL LATO DELLA SPUGNA DISPENSER CON UN TEMPO DI CONTATTO DI 3 MINUTI.                                                                                   | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO. MONOUSO.                             |
| ETHANOL 70% SPRAY<br>(ALCOOL ETILICO 70°)                       | DISINFETTANTE                         | SUPERFICI E PIANI DI LAVORO                                    | NEBULIZZARE SULLE SUPERFICI AD UNA DISTANZA DI 25 CM E CON TEMPO DI CONTATTO DI 5 MINUTI.                                                                                                                            | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| FENOCID<br>(MISCELA FENOLICA)                                   | DISINFETTANTE E DECONTAMINANTE        | DISPOSITIVI MEDICI E FERRI CHIRURGICI A CONTATTO CON LE MUCOSE | DILUIZIONE IL PRODOTTO IN ACQUA FINO AD UNA CONCENTRAZIONE DI 0,4% v/v CON TEMPO DI CONTATTO CON IL DISPOSITIVO PARI A 30 MINUTI.                                                                                    | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| GIOALCOL 70<br>(ALCOOL ETILICO 70°)                             | DISINFETTANTE                         | SUPERFICI E PIANI DI LAVORO                                    | APPLICAZIONE SENZA DILUIZIONE DEL PRODOTTO CON TEMPO DI CONTATTO CON LE SUPERFICI PARI A 30 MINUTI.                                                                                                                  | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| GIOCLOR<br>(SODIO IPOCLORITO 1,1%)                              | DISINFETTANTE                         | SUPERFICI E PIANI DI LAVORO                                    | DILUIRE IL PRODOTTO IN ACQUA FINO AD UNA CONCENTRAZIONE DI 5% v/v CON TEMPO DI CONTATTO PARI A 20 MINUTI.                                                                                                            | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| GIOPERACETIC<br>(ACIDO PERACETICO)                              | DISINFETTANTE                         | DISPOSITIVI MEDICI                                             | APPLICAZIONE SENZA DILUIZIONE DEL PRODOTTO CON TEMPO DI CONTATTO CON LE SUPERFICI PARI A 30 MINUTI.                                                                                                                  | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| GIOSEPT ONE<br>(MISCELA ENZIMATICA)                             | DISINFETTANTE E DECONTAMINANTE        | DISPOSITIVI MEDICI                                             | APPLICAZIONE SENZA DILUIZIONE DEL PRODOTTO CON TEMPO DI CONTATTO CON I DISPOSITIVI MEDICI PARI A 15 MINUTI.                                                                                                          | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| KIT SCRUB CLOREXIDINA ITALIANO<br>(CLOREXIDINA DIGLUCONATO 20%) | ANTISETTICO                           | CUTE INTEGRA                                                   | DISINFEZIONE DELLE MANI PRIMA DI PROCEDURE OPERATORIE, USANDO IL LATO DELLA SPUGNA DISPENSER CON UN TEMPO DI CONTATTO DI 3 MINUTI.                                                                                   | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO. MONOUSO.                             |
| LIFOSCRUB<br>(CLOREXIDINA 4% SOLUZIONE<br>SAPONATA)             | ANTISETTICO                           | CUTE INTEGRA                                                   | LAVAGGIO ANTISETTICO DELLE MANI CON UN VOLUME DI PRODOTTO PARI A 5 ML E TEMPO DI CONTATTO PARI AD 1 MINUTO.                                                                                                          | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| NEOGIOZYM<br>(MISCELA ENZIMATICA)                               | DISINFETTANTE                         | DISPOSITIVI MEDICI                                             | LAVAGGIO DELLE APPARECCHIATURE IN AMBITO UROLOGICO, ENDOSCOPICO E DI STRUMENTARIO OPERATORIO                                                                                                                         | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |

|                                                                 |             |                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEOMEDIL<br>(BENZALCONIO CLORURO 0,25% +<br>ALCOOL ETILICO 70°) | ANTISETTICO | CUTE INTEGRA        | PULIZIA E DISINFEZIONE DELLA CUTE INTEGRA O IN PRESENZA<br>DI FERITE SUPERFICIALI DI PICCOLE DIMENSIONI.<br>ANTISEPSI DELLE MANI. DELIMITAZIONE E PREPARAZIONE DEL<br>CAMPO OPERATORIO. | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON<br>SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO<br>DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| NEOXINAL ALCOLICO<br>(CLOREXIDINA 0,5% + ALCOOL ETILICO<br>70°) | ANTISETTICO | CUTE INTEGRA        | PULIZIA E DISINFEZIONE DELLA CUTE INTEGRA O IN PRESENZA<br>DI FERITE SUPERFICIALI DI PICCOLE DIMENSIONI.<br>PREPARAZIONE DEL CAMPO OPERATORIO. ANTISEPSI DELLE<br>MANI.                 | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON<br>SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO<br>DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| POVIDERM 10%<br>(IODOPOVIDONE 10%)                              | ANTISETTICO | CUTE LESA E INTEGRA | APPLICARE IL PRODOTTO NON DILUITO SULLA CUTE E<br>TAMPONARE LA ZONA DI APPLICAZIONE. RIPETERE LA<br>PROCEDURA MASSIMO 4 VOLTE AL GIORNO.                                                | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON<br>SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO<br>DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |
| SIMPLY GEL<br>(ALCOOL ETILICO DENATURATO 70°)                   | ANTISETTICO | CUTE INTEGRA        | DISINFEZIONE CHIRURGICA DELLE MANI CON TEMPO DI<br>CONTATTO DI 30 SECONDI.                                                                                                              | CONSERVARE A RIPARO LUCE E A TEMPERATURE NON<br>SUPERIORI AI 25 GRADI E PER UN PERIODO MASSIMO<br>DI 30 GIORNI DOPO L'APERTURA. |