

Traccia non stampata per Dr. En
Prof



TRACCIA PROVA 2

n. 15 Domande a risposta multipla

1 Nell'ambito della valutazione della discalculia, i risultati ad una delle due aree normalmente indagate non hanno una valenza diagnostica?

- A. Comprensione di informazioni numeriche
- B. Abilità di elaborazione numerica
- C. Abilità di calcolo
- D. Abilità di problem solving logico-matematico

2 E' uno strumento utile per raccogliere informazioni sullo sviluppo linguistico e comunicativo del bambino:

- A. IL Tipi 1
- B. IL PCAP
- C. IL MAC-ARTHUR Questionario
- D. IL primo vocabolario del bambino

3 Quale dei seguenti approcci logopedici è più indicato per paziente in età evolutiva con frenulo linguale alterato?

- A. Tecniche di allungamento/stretching del frenulo
- B. Esercizi per migliorare la coordinazione dei muscoli orali
- C. Frenulectomia seguita da esercizi post-intervento
- D. Rivalutazione del paziente in itinere perché crescendo il frenulo potrebbe allungarsi

4

Qual è l'approccio utilizzato nella riabilitazione della deglutizione disfunzionale?

- A. Terapia Miofunzionale per il rinforzo dei muscoli oro-faringei ed engramma a livello cerebrale
- B. Terapia comportamentale per gestire l'ansia legata alla deglutizione
- C. Terapia farmacologica per attivare la muscolatura orale
- D. Terapia basata sull' elettrostimolazione per la riattivazione della muscolatura orale

5 **Le Ipoacusie trasmissive in età pediatrica:**

- A. Non alterano lo sviluppo del linguaggio
- B. Sono poco frequenti
- C. Sono difficili da diagnosticare
- D. Sono frequentemente riscontrate

6 **L'utilizzo della CAA nei casi di bambini con disabilità intellettuale:**

- A. Non è mai ipotizzabile
- B. È possibile e consigliato a tutti i livelli di gravità
- C. Non è consigliato nei ritardi gravi
- D. Si, se si tratta di un ritardo mentale lieve

7 **In un bambino con paralisi cerebrale infantile (PCI) qual è l'approccio logopedico più corretto?**

- A. Utilizzo della CAA per comunicazione + ausili tecnologici
- B. Lavorare nel deficit intellettivo

C. Stimolazione del linguaggio; rinforzo - anche passivo - dei muscoli oro-facciali per ridurre la scialorrea ed attivare spinta linguale per evitare gastrostomia

D. Tutte le precedenti

8 Quale fra queste elencate riconosce dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia quali disturbi specifici di apprendimento:

A. Legge 170 dell'8 ottobre 2010

B. Legge 104 del 5 febbraio 1992

C. Direttiva BES e CTS del 27 dicembre 2012

D. Legge 833 del 23 dicembre 1978

9 Per non creare problemi ortodontici e articolatori, l'utilizzo del ciuccio deve essere dismesso

A. A 6 anni

B. Non oltre i 2 anni

C. A 6 mesi

D. Quando decide il bambino

10 Per la terapia della balbuzie in età evolutiva qual è l'approccio più indicato?

A. Psicoterapia

B. Psicoterapia del gruppo familiare

C. Trattamento farmacologico mio-rilassante

D. Approccio bio-psico-sociale

11 Nel trattamento delle disfonie infantili si utilizzano:

A. Tecniche respiratorie

- B. Movimenti del corpo nello spazio abbinato ai vocalizzi
- C. Canto con uso di strumenti tipo kazoo
- D. Tutte le precedenti

12 Nella comunicazione aumentativa alternativa cos'è una "Tabella a tema"

- A. Un insieme strutturato di rappresentazioni simboliche
- B. Un insieme strutturato di elenchi di vocabolario guidato
- C. Un insieme di schede in simboli per supportare lo sviluppo per i turni comunicativi
- D. Un insieme di simboli divisi per categorie semantiche alfabetiche

13 Qual'è la differenza principale tra ICD (International Classification of Disease) e ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)?

- A. Il primo descrive la classificazione delle malattie, il secondo descrive il funzionamento della persona contemplando anche i fattori esterni.
- B. Il primo descrive il funzionamento della persona contemplando anche i fattori esterni, il secondo descrive le condizioni di salute, quindi la malattia.
- C. Il primo classifica le malattie mentali, il secondo la disabilità.
- D. Nessuna delle alternative è corretta.

14 Quale tra le seguenti è classificata tra le forme fluenti di afasia?

- A. Afasia di conduzione
- B. Afasia di Broca
- C. Afasia transcorticale motoria
- D. Afasia globale

15 Voce gorgogliante, tosse e desaturazione pongono il sospetto di:

- A. Disfagia
- B. Disfonia
- C. Disartria
- D. Nessuna delle risposte è corretta.

En

L

Daf

T Boche OSITADA P.L.
S. D. C.



TRACCIA PROVA 1

n. 15 Domande a risposta multipla

1 Quali sono gli elementi fondamentali per una cartella logopedica?

- A. Dati Anagrafici del Paziente, Consenso Informato, Anamnesi Completa, Valutazione Logopedica, Obiettivi Riabilitativi, Programmazione del Trattamento, Monitoraggio e Rivalutazione
- B. Consenso Informato, Anamnesi Completa, Valutazione Logopedica, Obiettivi Riabilitativi
- C. Obiettivi Riabilitativi, Programmazione del Trattamento, Monitoraggio e Rivalutazione
- D. Anamnesi Completa, Valutazione Logopedica, Obiettivi Riabilitativi

2 La coclea si trova all'interno:

- A. Dell'orecchio interno
- B. Dell'orecchio medio
- C. Dell'orecchio esterno
- D. Della staffa

3 Nelle disfonie infantili quale tipo di approccio logopedico è più indicato?

- A. Terapia farmacologica per migliorare la fonazione
- B. Counseling informativo, igiene vocale, correzione dei comportamenti devianti, esercizi ludici per eliminare l'abuso vocale.
- C. Terapia psicologica per affrontare il disturbo vocale
- D. Trattamento fisioterapico/respiratorio

4 Quale Test si potrebbe utilizzare per la valutazione delle abilità narrative in un bambino di 4 anni?

- A. Frog Story

B. Bus Story

C. Script Semi-Strutturato

D. Prova di narrazione Pvn della Busco 3

5 La persistente difficoltà nella produzione dei suoni linguistici che interferisce con l'intelligenza dell'eloquio, è:

A. Disturbo fonetico fonologico

B. Disturbo della fluenza con esordio nell'infanzia

C. Disturbo della comunicazione sociale

D. Disturbo della condotta

6 Quali protocolli/test standardizzati vengono usati nella valutazione della disartria?

A. Frenchay Dysarthria Assessment – Second Edition (FDA-2)

B. Assessment of Intelligibility of Dysarthric Speech (AIDS)

C. Batteria per la Valutazione della Disartria

D. Tutte le precedenti

7 Qual è l'approccio utilizzato nella riabilitazione della deglutizione disfunzionale?

A. Terapia Miofunzionale per il rinforzo dei muscoli oro-faringei ed engramma a livello cerebrale

B. Terapia comportamentale per gestire l'ansia legata alla deglutizione

C. Terapia farmacologica per attivare la muscolatura orale

D. Terapia basata sull' elettrostimolazione per la riattivazione della muscolatura orale

8 Quale fra queste elencate riconosce dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia quali disturbi specifici di apprendimento:

- A. Legge 170 dell'8 ottobre 2010
- B. Legge 104 del 5 febbraio 1992
- C. Direttiva BES e CTS del 27 dicembre 2012
- D. Legge 833 del 23 dicembre 1978

9 Quali sono le caratteristiche cliniche della disprassia verbale in età evolutiva?

- A. Incoerenza nella produzione fonemica
- B. Difficoltà nei movimenti articolatori volontari
- C. Alterazioni della prosodia
- D. Tutte le precedenti

10 Tra gli Indici di Rischio di un "Disturbo Primario di Linguaggio" si colloca:

- A. Un vocabolario inferiore a 50 parole a 24 mesi.
- B. L'assenza della combinatoria a 18 mesi.
- C. La presenza della triangolazione dello sguardo ma senza l'uso del gesto.
- D. Una lallazione eccessivamente variata associata a gesti deittici a 8 mesi.

11 In quale momento della vita si passa da una deglutizione neonatale ad una deglutizione di tipo "adulto"?

- A. Dai 6 anni di età
- B. In età adolescenziale
- C. Quando la dentizione permanente è completa
- D. Dai 6 mesi

12 Nello sviluppo della narrazione la prima forma di racconto del bambino è:

- A. Lo script

- B. Il racconto autobiografico
- C. Il racconto di fantasia
- D. Nessuna delle alternative è corretta.

13 In quale fase della deglutizione il logopedista può intervenire ai fini terapeutici per riabilitare la funzione?

- A. Fase anticipatoria
- B. Fase di preparazione extraorale
- C. Fase buccale
- D. Fase faringea

14 La balbuzie in età evolutiva può essere considerata:

- A. Disturbo transitorio della fluenza risolvibile entro 6 mesi
- B. Disturbo linguistico-motorio di origine neurobiologica e genetica
- C. Atteggiamento imitativo
- D. Risultato di uno stress emotivo

15 La categoria percettiva che prevede la capacità di definire se due stimoli sono uguali o diversi è:

- A. Il riconoscimento
- B. La detezione
- C. La discriminazione
- D. L'identificazione

TRACCIA PROVA 3
Carlo S.
M.



TRACCIA PROVA 3

n. 15 Domande a risposta multipla

- 1 Quale è il periodo sensibile per lo sviluppo delle vie uditive, oltre il quale il ripristino della funzione uditiva diminuisce notevolmente la propria efficacia?
- A. Entro i primi 5 anni
 - B. Entro i primi 3 anni
 - C. Entro i primi 2 anni
 - D. Entro i primi 6 mesi
- 2 Durante l'anamnesi di un bambino con disturbo articolatorio di linguaggio, oltre ai Test specifici il logopedista deve anche:
- A. Valutare le funzioni orali
 - B. Inviare dallo psicologo per Test psicodiagnostici
 - C. Suggerire accertamenti clinici diagnostici
 - D. Tutte le precedenti
- 3 Quale, tra questi, non è un trattamento indicato nel caso di un carcinoma laringeo?
- A. AGOASPIRATO
 - B. CHEMIOTERAPIA
 - C. RADIOTERAPIA
 - D. TERAPIA CHIRURGICA
- 4 La Terapia Miofunzionale (TMF) è:

- A. Una ginnastica dei muscoli orali
- B. Una ri-programmazione dell'atto deglutorio a livello cerebrale
- C. Una serie di prassie oro-facciali
- D. Un percorso riabilitativo affidato a fisioterapisti

5 IL BUS STORY valuta le abilità narrative nella fascia di età:

- A. Da 3 - a 8 aa
- B. Da 9 - a 10 aa
- C. Da 2 - a 5 aa
- D. Da 3 - a 13 aa

6 E' opportuno intraprendere la TMF in un bambino succhiatore di dito?

- A. No perché il palato è ogivale e non consentirebbe alla lingua di arrivare ad impattarlo
- B. Si, certo
- C. La TMF fa perdere il vizio del ciucciare
- D. Qualche volta

7 La Batteria per la Valutazione del Linguaggio (BVL) valuta le capacità linguistiche del bambino nella fascia di età:

- A. Da 3 - a 11 aa
- B. Da 12 - a 18 aa
- C. Da 4 - a 12 aa

D. Dai 12 anni in su

8 Cosa si intende per Fetofagia e Pedofagia

- A. Modalità di deglutizione del feto e poi in età evolutiva
- B. Modalità di suzione
- C. Modalità degluttoria disfunzionale
- D. Modalità mista nel deglutire

9 Nella Costituzione Italiana il diritto alla salute è garantito dall'articolo:

- A. 32
- B. 22
- C. 2
- D. 42

10 Cos'è la disfonia?

- A. Alterazione della voce di origine organica o funzionale
- B. Negazione per la musica e il canto
- C. Un disturbo della deglutizione
- D. Incapacità di pronunciare correttamente i suoni linguistici (foni)

11 Chi può erogare servizi di assistenza in convenzione?

- A. ENTI PRIVATI
- B. ENTI PUBBLICI
- C. NÉ ENTI PUBBLICI NÉ PRIVATI
- D. ENTI PUBBLICI E PRIVATI IN CONVENZIONE

12 Quale fra queste elencate riconosce dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia quali disturbi specifici di apprendimento:

- A. Legge 170 dell'8 ottobre 2010
- B. Legge 104 del 5 febbraio 1992
- C. Direttiva BES e CTS del 27 dicembre 2012
- D. Legge 833 del 23 dicembre 1978

13 In quale fase della deglutizione il logopedista può intervenire ai fini terapeutici per riabilitare la funzione?

- A. Fase anticipatoria
- B. Fase di preparazione extraorale
- C. Fase buccale
- D. Fase faringea

14 Le prove MT sono:

- A. Strumento standardizzati e scientificamente validati
- B. Prove per la valutazione delle abilità di lettura, comprensione, scrittura e matematica
- C. Tutte le precedenti
- D. Nessuna delle precedenti

15 Esiste una balbuzie fisiologica?

- A. Si, dai 2 ai 3 anni
- B. No, negli ultimi 5 anni si è scoperto che è "balbuzie" già in tenera età
- C. Si, dai 3 ai 5 anni
- D. Si, è dovuta a fattori ambientali